CombiMilk® Lämmermilch

für Schaf- und Ziegenlämmer

Milchaustauscher für Schaf- und Ziegenlämmer mit Magermilchpulver, ohne pflanzliche Proteine

Zusammensetzung

22,00 % Protein	19,00 % Rohfett	7,00 % Rohasche	1,10 % Calcium	0,40 % Natrium
2,00 % Lysin	0,05 % Rohfaser	50 % MMP	0,60 % Phosphor	

25.000 I.E. Vitamin A	Vitamin B-Komplex	Zink	Selenhefe	Pantothensäure
4.000 I.E. Vitamin D^3	Aromen	Kupfer	Eisen	Biotin
300 mg Vitamin E	Emulgator	Niacin	Jod	
Vitamin C	Milchsäurebakterien	Mangan	Eipulver (immunglobulinreich)	

Abpackung

25 kg Spezialpapiersack oder im wiederverschließbaren 10 kg Eimer

Einsatzempfehlung

Direkt nach der Geburt ist die Versorgung mit Biestmilch entscheidend - das Lamm muss möglichst viel Kolostrum aufnehmen, um das Immunsystem zu stärken. Anschließend kann CombiMilk® Lämmermilch sowohl als alleinige Milchtränke in der mutterlosen Aufzucht oder als Ergänzung bei mangelhafter Milchleistung der Mutter vertränkt werden.

Der Milchaustauscher wird in der rationierten Fütterung (siehe Tränkeplan) bei 40-45 °C angemischt und bei ca. 38 °C vertränkt. Lämmer benötigen in den ersten Wochen viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Die Milch wird über einen Nuckel angeboten. Je kleiner die Milchmenge pro Mahlzeit und je größer die Anzahl der Mahlzeiten pro Tag, desto sicherer gelingt die Aufzucht. Zusätzlich wird den Lämmern Mawel Lämmerkraft, gutes Heu und frisches Wasser zur freien Aufnahme angeboten.
Die Lämmer werden nach etwa 50 Tagen oder sobald sie 250 g Mawel Lämmerkraft pro Tag aufnehmen, von der Tränke abgesetzt.

Einsatzkonzentration

Schaflamm: ca. 200 g pro Liter Wasser
Ziegenlamm: ca. 150 g pro Liter Wasser

Tränkeplan-Vorschlag

	Zartes Lamm; ml / Mahlzeit	Starkes Lamm; ml / Mahlzeit	Mahlzeit pro Tag
1. Woche	50-100	100-200	6-8
2. Woche	100-150	200-300	4-6
3. Woche	150-200	300-400	3-4
4. Woche	200-250	400-500	3-4
5. Woche	250-300	400-500	2-3
6. Woche	250-300	400-500	2
7. Woche	250-300	400-500	1

CombiMilk

Stärkt die Abwehrkräfte Ihrer Kälber.