

Wichtig! Fehler in der letzten Fachinfo: Movento 100 SC darf nur bis 14 Tage vor der Blüte eingesetzt werden

Bestände auf Läuse kontrollieren

Bei allen Kulturen (Folie, Freiland) ist jetzt mit dem Auftreten von Läusen zu rechnen. Deshalb ist es ratsam die Bestände regelmäßig zu kontrollieren. Die Bekämpfung sollte nach Möglichkeit bei warmer Witterung mit ausreichend Wasser (1.000 l/ha) erfolgen. Eingesetzt werden können:

Produkt		vor der Blüte	in die Büte	Hinweise	Wartezeit
Eradicoat (25-37,5 l/ha)	B2	x	x		F
Pirimor Granulat (0,75 kg/ha)	B4	x	x		7
Calypso (0,25 l/ha)	B4	x	x	nicht mit Azolen sonst B1, NB 6613	3
Movento 100 SC (0,75 l/ha)	B1	x	-	bis 14 Tage vor der Blüte	F
Karate Zeon (75 ml/ha)	B4	x	x	nicht mit Azolen sonst B2, NB 6623	7

Unkrautkontrolle im Nachauflauf

Wenn bisher keine Voraufbehandlung erfolgt ist, sich aber bereits aufgelaufene Unkräuter im Zwei- bis Vierblattstadium finden lassen, macht eine Unkrautbekämpfung mit **2,0 l/ha Betasana SC + 0,7 l/ha Spectrum** (Gräserwirkung im VA) Sinn. Dabei ist es wichtig, dass bei der Behandlung warmes wüchsiges Wetter ist. Eine zweite Behandlung nach ca. 14 Tagen kann sinnvoll sein (**Spectrum Einsatz nur vor der Blüte**). Große durchgewachsene Unkräuter sollten von Hand ausgezogen werden.

In einigen Beständen ist auch in diesem Jahr ein starkes Auftreten von Kamille zu beobachten. Hier kann **0,167 kg/ha Lontrel 720 SG** oder **1,2 l/ha Vivendi 100** eingesetzt werden Die Kamillen sollten nicht größer als eine 2-Euro-Münze sein, „Korona“-Bestände sollten nicht behandelt werden, um Schäden zu vermeiden. Von der Winterversiegelung nicht erfasste Gräser können mit **1,0 l/ha Fusilade Max** vor der Blüte bekämpft werden.

Dreifachmischungen von Herbiziden sollten aus Verträglichkeitsgründen vermieden werden.

VA/NA des Unkraut/-gras

Betasana SC 2,0 l/ha (Ehrenpreis, Gänsedistel, Hirtentäschel, usw.)
 + **(Spectrum 0,7 l/ha)** (Kamille, Kreuzkraut usw.)

NA Kamille, Kreuzkraut u. Disteln:
Lontrel 720 SG 0,167 kg/ha oder
Vivendi 100 1,2 l/ha

NA Gräser vor der Blüte:
Fusilade Max 1,0 l/ha



BBCH 97-00
 Ende der
 Vegetationsruhe



BBCH 55
 Blütenanlage



BBCH 57
 vor der Blüte

* Sortenverträglichkeit beachten! Unverträglichkeit z. B. bei der Sorte Korona u.a.