

Erste Fungizidmaßnahmen einplanen

Nicht beerntete, sowie aus dem Ertrag genommene 2- und 3-jährige Anlagen, aber auch 2-jährige Erdpresstopfanlagen sollten neben einer Spargelfliegenbehandlung auch schon einen ersten Fungizidschutz erhalten. Hierfür bieten sich Belagsfungizide wie **Cuprozin Progress (2,0 l/ha max. 6x)** oder **Funguran Progress (1,4 kg max. 2x)** an. Da der Aufwuchs noch wenige Phyllokladien hat, erreicht die Maßnahme direkt den Haupttrieb und sorgt so für einen Belag in einem Bereich, der bei den folgenden Behandlungen nur noch schwer zu erreichen ist.

Außerdem ist bei allen aufwachsenden Anlagen mit dem Auftreten von **Spargelfliegen** zu rechnen. Die wechselhaften Temperaturen der letzten Wochen sorgen für eine recht unterschiedliche Flugintensität der Spargelfliege. Vor allem in den Gebieten mit einem hohen Potential an Spargelfliegen (Altanlagen, Grünspargelflächen in der Umgebung) ist die Gefahr am größten. In der Region Nienburg und Walsrode lagen die Fangzahlen in dieser Woche schon über der Bekämpfungsschwelle von 5 Fliegen pro Falle. Sinnvoll in Anlagen mit Spargelfliegenbefall ist eine Kombination der Fungizidmaßnahme mit einer Insektizidmaßnahme:

bis 3 Wochen vor der Blüte: Benevia (0,75 l/ha, B1, max. 1x, Bandbehandlung, Auflagen beachten!) oder

bis vor der Blüte: Danadim Progress (0,6 l/ha, B 1, max. 6x, Bandbehandlung, Ende der Aufbrauchfrist 30.06.2020).

Ab der Blüte können dann nur noch B4-Produkte (z.B. **Karate Zeon, Calypso**) als Mischpartner verwendet werden. Diese Maßnahmen sind bei allen Anlagen ab einer Wuchshöhe von 20 cm durchzuführen. Die Behandlung ist im Abstand von 10-14 Tagen mit geeigneten Mitteln zu wiederholen.

Auf Spargelhähnchen- und Spargelkäferbefall achten!

Neben der Spargelfliege kann es auch zu einem Befall mit **Spargelhähnchen, Spargelkäfer** kommen. Die Tiere treten teilweise sehr massiv auf. Vor allem die Randbereiche der Flächen sollten kontrolliert werden, da hier zumeist die ersten Tiere zu finden sind. Eine Behandlung der betroffenen Fläche kann mit **200 ml/ha Calypso (B 4), 325 g/ha Mospilan SG (B4), 75 ml/ha Karate Zeon (B 4) oder 150 g/ha Lamdex forte (B 4)**, erfolgen. **Bei allen genannten Insektiziden sollte aufgrund der Auflage NN410 die Anwendung in die Abendstunden nach dem täglichen Bienenflug erfolgen.**

Düngung in Spargelertragsanlagen

Die Düngung der Spargelflächen sollte nach Ernteende erfolgen. Dabei sollten folgende Nährstoffgehalte im Boden angestrebt werden. Bei allen Stickstoffdüngungen sollte der Bodenvorrat gemessen (Nmin-Wert) oder geschätzt werden (Richtwert LWKs) und vom Bedarfswert der Kultur abgezogen werden. Die verbleibende Differenz sollte dann gedüngt werden.

Düngeempfehlung für Spargel

(nach Feldabfuhr und Einlagerung in die Speicherwurzeln)

Alter der Kultur Spargel 15-20.000 Pfl./ha	Ertrag (dt/ha)	Nmin- Bedarfswert	P ₂ O ₅ (kg/ha)	K ₂ O (kg/ha)	MgO (kg/ha)
1. Standjahr	0	140	50	175	60
2. Standjahr	20	160	50	175	60
3. Standjahr	80	160	50	175	60
ab 4. Standjahr	100	80	20	90	30

Die neue Pflanzenbau-
App IQ Plant – Die
Wurzel für Ihren Erfolg.

Jetzt QR-Code scannen
und downloaden!

