

Fungizideinsatz

Nach den Niederschlagsereignissen, die regional unterschiedlich stark ausfielen, sollten die Spritzabstände ca. 7 Tage betragen (nach Zorvec Enicade 10 Tage). In den kommenden Tagen werden hohe Temperaturen erwartet. Achten Sie deshalb auch auf ausreichenden Schutz gegen Alternaria Arten.

Gewässerabstände:
Regelabstand
90/75/50 %

**Krautfäule, Systemische Verteilung,
schnell regenfest, abwechselnd mit
anderen Fungiziden**

**AGRAVIS Zorvec EV Pack
0,15 l + 0,225 kg
(Zorvec Enicade + Versilus)**

1*
1*/1*/1
*

[Zorvec besitzt im Vergleich zu allen anderen Fungiziden die deutlich stärkere Krautfäuleleistung]

oder

**Krautfäule + Alternaria
Teilsystemische Verteilung,
schnell regenfest**

**Revus Top
0,6 l/ha**

5
1*/5/5

oder

**Krautfäule + Alternaria
Teilsystemische Wirkung,
bei geringem Krautfäuledruck**

**Nautile WG
2,0 kg/ha**

-
10/20/-

**Alternaria Spezialfungizide
(zusätzlich zur Krautfäulebekämpfung)**

Narita 0,5 l/ha

5
1*/1*/5

oder

Signum 0,25 kg/ha

5
1*/1*/1*

Tierische Schädlinge

In der vergangenen Woche waren neben Kartoffelkäfern teilweise auch Läuse zu finden.

**Nur Kartoffelkäfer
lange Wirkungsdauer**

**Coragen (B4 Auflage!)
60 ml/ha**

1*
1*/1*/1*

Läuse, Kartoffelkäfer

**Mospilan SG (B4 Auflage!)
0,25 kg/ha**

5
1*/1*/5

oder

Läuse, Kartoffelkäfer

**Biscaya (B4 Auflage!)
0,3 l/ha**

5
1*/1*/5

Mospilan SG und Biscaya werden in Mischung mit dem Wirkstoff Difenoconazol (Narita, Revus Top) als bienengefährlich (B1) eingestuft! Beim Einsatz von Mospilan SG keine Netzmittel verwenden!

[* = länderspez.
Mindestabstand]

In den vergangenen Jahren kam es regional bei anfälligen Sorten immer wieder zu erheblichen Schäden durch das Auftreten der Gemeinen Spinnmilbe. Vor allem heiße und trockene Witterung begünstigt das Auftreten und die rasche Vermehrung dieses Schädling. In diesem Jahr empfehlen wir die unten aufgeführten Produkte zur Bekämpfung einzusetzen. Milbeknock und Apollo 50 SC haben eine Notfallzulassung erhalten. Movento 150 OD hat eine Zulassung gegen Läuse, jedoch eine gute Nebenwirkung gegen Spinnmilben. Beachten Sie bitte die Anwendungsempfehlungen bzw. unterschiedlichen Auflagen und Wirkungsweisen. Bisher gab es noch keinen Befall. In der Vergangenheit trat Erstbefall häufig um den Monatswechsel Juni / Juli auf.

Empfindlich sind u. a. die Sorten Saprodi, Aveka, Altus, Stratos, Sarion, Avarna und Markies.

Bei der Verwendung von Apollo 50 SC und Milbeknock sollte ein Netzmittel (z. B. Break Thru S 301, Li 700) verwendet werden.

Movento 150 OD ist ab Ende der Blüte des ersten Blütenstandes zugelassen. Der Abstand zu anderen Spritzungen sollte drei Tage nicht unterschreiten.

Produkt	AWM in l/ha	Wasser in Liter	Anzahl	Bienen	Bemerkungen	Gewässerabstände: Regelabstand 90/75/50 %
Apollo 50 SC	0,4	400-800	1	B 4	Kontakt	1* 1*/1*/1*
Milbeknock	1,0	800-1000	1	B 1	teilsystemisch	10 1*/5/5
Movento 150 OD	0,5	200-500	4	B 1	Systemisch, solo anwenden! Nebenwirkung Spinnmilben	1* 1*/1*/1*