

Die früh gedrillten Getreidebestände haben das 2-/3-Blattstadium erreicht. Kontrollieren Sie **ab dem Auflaufen** intensiv Ihre Bestände auf Befall mit **Blattläusen / Zikaden**. An sonnigen Tagen lassen sich die Blattläuse leicht im Gegenlicht der Sonne auf dem Blatt oder an der Blattunterseite erkennen. Bestände, die in der Nähe von geernteten Maisflächen, Ausfallgetreide/-raps, Kulturraps und Zwischenfrüchten stehen, sind am stärksten gefährdet. Die **Schadschwelle** wird mit **10 % befallene Pflanzen** angegeben (erste ungeflügelte Läuse sind zu finden). Ist der Orientierungswert erreicht, muss in einem Zeitraum von **3-5** Tagen gehandelt werden.

Getreideblattläuse übertragen das Gersten-Gelbverzwergungs-Virus (BYDV). Die Wandersandzirpe (Zwergzikade) überträgt das Weizen-Verzwergungsvirus (WDV). **Achtung:** anders als die Namen es vermuten lassen, können beide Viruserkrankungen alle Wintergetreidearten schädigen, Gerste reagiert am empfindlichsten. Mögliche Schäden durch Virosen reichen von 10 % Ertragsverlust bis zu einem Totalausfall. Je wärmer der Herbst ist, desto höher ist die Vermehrungsrate / Aktivität der Schädlinge und damit die Virusausbreitung. Zu einer Erstbehandlung im 1- bis 3-Blattstadium empfehlen wir die Pyrethroide (z. B. Karate Zeon). Beim Einsatz von Insektiziden ist auf eine gute Benetzung zu achten. Eine Wasseraufwandmenge von mind. 300 l/ha, optional eine Doppelflachstrahldüse und die Zugabe eines Netzmittels verbessern die Wirkung deutlich. Auch nach einer erfolgten Behandlung ist es weiterhin wichtig die Bestände zu kontrollieren, um bei Bedarf eine zweite Maßnahme zu platzieren. Für eine Zweitbehandlung bei anhaltender Vegetation kann das systemisch wirkende Produkt Teppeki (sehr gute Dauerleistung aber eingeschränkte Sofortwirkung) eine Option sein. Teppeki besitzt im Herbst ausschließlich eine Zulassung in der Wintergerste.

Hinweis Mischbarkeit

Die empfohlenen Insektizide sind mit Blattdüngern mischbar. Karate, PHYTAVIS Venator und Somicidin können bei Bedarf auch mit Herbiziden kombiniert werden (dann kein Netzmittel).

Insektizide mit Zulassung in WG, WW, WR, WT (Blattläuse als Virusvektoren)

<u>Produkt:</u>	<u>Dauerleistung:</u>	<u>Aufwandmenge:</u>	<u>Gewässerabstände:</u>
			90 / 75 / 50 %
Karate Zeon	4 - 6 Tage	75 ml/ha	5 / 5 / 10 m
PHYTAVIS Venator	4 - 6 Tage	150 g/ha	5 / 5 / 10 m
Somicidin Alpha EC	4 - 6 Tage	200 ml/ha	5 / 10 / 15 m
Teppeki (nur W.-gerste)	8 - 21 Tage	100 g/ha	1 m

Spurenelementeinsatz:

Durch den Einsatz von Spurenelementen erhöht sich die Vitalität der Getreidebestände und somit gleichzeitig die Winterfestigkeit. Insbesondere Bor, Kupfer und Mangan fördern ebenfalls den Abbau bzw. die Verträglichkeit der Herbizidwirkstoffe. Standorte mit hohen Humusgehalten, schlechter Rückverfestigung und/oder Flächen mit erhöhten pH-Werten neigen zur Festlegung von Spurennährstoffen, wie z. B. Mangan (Mn). Durch eine ausreichende Manganversorgung wird die Bestockung und die Wurzelbildung unterstützt. Besonders Gerste zeigt sehr schnell Mangelercheinungen und reagiert auf allen Standorten sehr effektiv auf eine Blattdüngung. Andere Getreidearten zeigen nicht so schnell offensichtliche Symptome, leiden bei „Versorgungsengpässen“ aber in gleichem Maße. So sollte beispielweise auf einer Fläche, auf der die Gerste regelmäßig einen Manganmangel zeigt, auch andere Kulturen standardmäßig mit Mikronährstoffen versorgt werden. Eine Herbstapplikation ab dem 3-Blattstadium ist deutlich effizienter einzustufen, als Reparaturmaßnahmen im Frühjahr. Bereits geschädigte Bestände lassen sich häufig nur sehr schwer wieder „aufpäppeln“.

Empfehlung ab 3-Blattstadium:

1,5-2,0 l/ha PHYTAVIS Getreide Gold
(Cu 55 g/l, Mn 285 g/l, Zn 105 g/l, S 100 g/l, B 18 g/l)

Schnecken nicht vergessen!

Regional lässt sich weiterhin verstärkte Schneckenaktivität beobachten. Besonders tonige Standorte oder Flächen mit Raps als Vorfrucht sollten unbedingt im Auge behalten werden.

AGRAVIS Raiffeisen AG . Pflanzenbau-Vertriebsberatung

Industrieweg 110 . 48155 Münster . Tel. 0251 / 682-2368 | Plathnerstr. 4A . 30175 Hannover . Tel. 0511 / 8075-3525

Sie können diesen Newsletter unter Fax-Nr. 0251 / 682-4360 oder per e-Mail an silvia.grosse.bordewick@agravis.de mit dem Betreff „Abmeldung“ abbestellen. Fax-Empfänger können auch gerne auf e-Mail umstellen.

Dieser Newsletter dient der Information und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr oder Haftung können wir nicht übernehmen.

© AGRAVIS Raiffeisen AG