

Virtueller Branchentreff Sonderkulturen am 3. Februar 2023

Auch in 2023 wird es wieder einen Virtuellen Branchentreff Sonderkulturen geben. Am 3. Februar 2023 von 10.00-12.00 Uhr und von 14.00-16.00 Uhr geht es um Themen rund um Anbau, Pflanzenschutz, Düngung, Biostimulanzien und Folien. Mehr dazu finden Sie unter www.branchentreff-sonderkulturen.de.

Ich freue mich, Sie am 3. Februar 2023 online begrüßen zu dürfen.



Jetzt an die Winterversiegelung denken

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Einsatz von Herbiziden zur Bodenversiegelung. Hierfür bieten sich **Kerb FLO / Setanta Flo** und **Stomp Aqua** an. Bei der Behandlung muss der Boden feucht sein. Kerb Flo sollte nur angewendet werden, wenn die Bodentemperaturen nachhaltig unter 10° C gesunken sind, da es ansonsten verdampfen kann. Kerb FLO braucht für eine gute Wirkung ausreichend Bodenfeuchte. Die Ausbringung der Herbizide kann bis Ende Januar erfolgen. Dabei gilt, je später die Ausbringung erfolgt, desto länger die Wirkung im Frühjahr. Kerb FLO erfasst alle Ungräser und Ausfallgetreide außer Flughafer und Quecke. Zusätzlich wirkt es gut gegen Vogelmiere und Ehrenpreis, aber es hat keine ausreichende Wirkung auf Kamille. Deswegen macht eine Kombination mit Stomp Aqua Sinn, um ein breites Spektrum an Unkräutern abzudecken. Stomp Aqua solo kann eingesetzt werden, wenn nur Ackerstiefmütterchen oder Kamille vorhanden sind.

Winterversiegelung

<p>Verunkrautung vorhanden <i>AFU, WH, Einj. Rispe, Ehrenpreis, Ackerstiefmütterchen, Taubnessel, Vogelmiere usw.</i></p> <p>Kerb FLO / Setanta Flo 1,0 - 1,25 l/ha* + Stomp Aqua 2,2 - 2,70 l/ha* + Herbosol 0,40 l/ha</p>	<p>z. Zt. unkrautfrei, Vorauflaufbehandlung <i>Probleme mit Einj. Rispe, Ehrenpreis, Ackerstiefmütterchen oder Kamille</i></p> <p>Stomp Aqua 2,5 - 3,0 l/ha* + Herbosol 0,4 l/ha</p>
---	---



BBCH 97-00

Vegetationsruhe



BBCH 97-00

Vegetationsruhe

* bei Grünpflanzen im Pflanzjahr geringere Aufwandmenge wählen

Vliesabdeckung zum Schutz vor Winterfrösten

Nach den Erfahrungen mit Auswinterungen und Winterfrostschäden in den letzten Jahren empfiehlt sich das Abdecken der Erdbeeren mit Vlies. Hierfür kann ein mind. 30 g/m² schweres Vlies verwendet werden oder es muss eine Abdeckung mit 2 Lagen leichterem Vlies erfolgen. Dammkulturen sollten unbedingt abgedeckt werden. Die Herbizid-Anwendung sollte einige Tage vor dem Abdecken erfolgen. Außerdem ist es sinnvoll den Bestand regelmäßig auf den Befall mit Feld- und Wühlmäusen zu kontrollieren.