

Aufgrund der nassen Frühjahrswitterung war die Aussaat des Sommergetreides teilweise erst recht spät möglich. Dementsprechend ist die Entwicklung der Bestände sehr unterschiedlich vorangeschritten. Sehr früh gedrillte Bestände befinden sich bereits in der Bestockung. Spätere Bestände befinden sich gerade erst im Auflaufen. Bei geplanten Herbizidmaßnahmen gilt es schlagspezifisch das richtige Timing zu finden. Der Einsatz sollte erfolgen, wenn der Großteil der Unkräuter das erste bis zweite Laubblatt ausgebildet haben.

### Düngung

Sommergetreidebestände, die noch nicht fertig ausgedüngt sind, sollten zu Schossbeginn die restliche N-Menge erhalten. Bei Sommerweizen sollte außerdem noch eine Qualitätsgabe eingeplant werden (Menge und Zeitpunkt an Wasserversorgung anpassen).

Achten Sie zusätzlich auf eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen. Besonders Mangan und Kupfer spielen eine wichtige Rolle. Eine Blattdüngung kann ab dem 3-Blattstadium erfolgen.

Empfehlung: PHYTAVIS Getreide Gold: 1,5-2,0 l/ha (100 g/l S, 285 g/l Mn, 105 g/l Zn, 55 g/l Cu, 18 g/l B)

Kontrollieren Sie die Bestände außerdem regelmäßig auf einen Befall mit Blattläusen. Eine Virusinfektion kann zu bedeutenden Schäden führen. Aktuell sind zumindest im Wintergetreide unerwartet häufig Läuse zu finden!

## Unkrautbekämpfung Nachauflauf (S.-Hafer, S.-Gerste und S.-Weichweizen):

### Breite Mischverunkrautung inklusive:

Gewässerabstände:  
Regelabstand  
90/75/50 %

Distel, Kamille, Klettenlabkraut, Kornblume,  
Gänsefuß / Melde, Windenknöterich

**Ariane C 0,75 l/ha**  
**+ U 46 M 1,0 l/ha**

1\*  
1\*/1\*/1\*

Kamille, Klettenlabkraut, Stiefmütterchen,  
Gänsefuß / Melde

**Pointer Plus 50 g/ha**  
**+ U 46 M 1,0 l/ha**

5  
1\*/1\*/5

Kamille, Gänsefuß / Melde, Storchnabel, Kerbel

**Potacur SX 50 g/ha**  
**+ U 46 M 1,0 l/ha**

5  
1\*/1\*/1\*

## Gräserbekämpfung Nachauflauf (S.-Gerste und S.-Weichweizen):

### Gräserbekämpfung ab 3-Blattstadium:

Windhalm, Flughafer: 0,9 l/ha Axial 50

Ackerfuchsschwanz: 1,2 l/ha Axial 50  
(Weidelgras)

**Axial 50**  
**0,9-1,2 l/ha**

1\*  
1\*/1\*/1\*

Axial: nicht in Hafer

Bei Windhalm ist eine Kombination mit Ariane C oder Biathlon 4D möglich.

\*= länderspezifischer Mindestabstand (Beachten Sie die Anforderungen nach GAP und PflSchAnwVO)