

Zulassung für Pirimor Granulat läuft aus

Die **Abverkaufsfrist für Pirimor Granulat (052470-00) läuft am 30.04.2021** aus. Das Produkt kann noch bis zum 30.04.2022 eingesetzt werden, deswegen macht es Sinn, sich für 2021 mit Pirimor Granulat zu bevorraten. Das neu zugelassene Pirimor G darf in Erdbeeren nicht eingesetzt werden.

Jetzt an die Winterversiegelung denken

In den nächsten Wochen ist der richtige Zeitpunkt für den Einsatz von Herbiziden zur Bodenversiegelung. Hierfür bieten sich **Kerb FLO** und **Stomp Aqua** an. Bei der Behandlung muss der Boden feucht sein. Kerb Flo sollte nur angewendet werden, wenn die Bodentemperaturen nachhaltig unter 10° C gesunken sind, da es ansonsten verdampfen kann. Kerb FLO braucht für eine gute Wirkung ausreichend Bodenfeuchte. Die Ausbringung der Herbizide kann bis Ende Januar erfolgen. Dabei gilt, je später die Ausbringung erfolgt, desto länger die Wirkung im Frühjahr. Kerb FLO erfasst alle Ungräser und Ausfallgetreide außer Flughäfer und Quecke. Zusätzlich wirkt es gut gegen Vogelmiere und Ehrenpreis, aber es hat keine ausreichende Wirkung auf Kamille. Deswegen macht eine Kombination mit Stomp Aqua Sinn, um ein breites Spektrum an Unkräutern abzudecken. Stomp Aqua solo kann eingesetzt werden, wenn nur Ackerstiefmütterchen oder Kamille vorhanden sind.

Winterversiegelung

<p>Verunkrautung vorhanden <i>AFU, WH, Einj. Rispe, Ehrenpreis, Ackerstiefmütterchen, Taubnessel, Vogelmiere usw.</i></p> <p>Kerb FLO 1,0 - 1,25 l/ha* + Stomp Aqua 2,2 – 2,7 l/ha*</p>	<p>z. Zt. unkrautfrei, Vorauflaufbehandlung <i>Probleme mit Einj. Rispe, Ehrenpreis, Ackerstiefmütterchen oder Kamille</i></p> <p>Stomp Aqua 2,5 - 3,0 l/ha*</p>
--	--



BBCH 97-00

Vegetationsruhe



BBCH 97-00

Vegetationsruhe

* bei Grünpflanzen im Pflanzjahr geringere Aufwandmenge wählen

Vliesabdeckung zum Schutz vor Winterfrösten

Nach den Erfahrungen mit Auswinterungen und Winterfrostschäden in den letzten Jahren empfiehlt sich das Abdecken der Erdbeeren mit Vlies. Hierfür kann ein mind. 30 g/m² schweres Vlies verwendet werden oder es muss eine Abdeckung mit 2 Lagen leichterem Vlies erfolgen.

Dammkulturen sollten unbedingt abgedeckt werden. Die Herbizid-Anwendung sollte einige Tage vor dem Abdecken erfolgen. Außerdem ist es sinnvoll den Bestand regelmäßig auf den Befall mit Feld- und Wühlmäusen zu kontrollieren.