

Herbizidempfehlungen in Spargel

Junganlagen

Artist 2,0*-2,5 kg/ha


← **AFU, WH, Einj. Rispe, W.-Gänsefuß, Hirtentäschel, Kamille, Klettenlabkraut, Knöterich-Arten, Nachtschatten, Stiefmütterchen, Taubnessel, Vogelmiere**

Stomp Aqua 3,0*-3,5 l/ha + Spectrum 1,0*-1,4 l/ha + Herbosol 0,4 l/ha

← **Einj. Rispe, Ehrenpreis, W.-Gänsefuß, Kamille, Nachtschatten, Stiefmütterchen, Taubnessel, Vogelmiere**

Sencor Liquid 0,5 l/ha

← **Einj. Rispe, Hirtentäschel, W.-Gänsefuß, Kamille, Stiefmütterchen, Taubnessel, Vogelmiere**



- Kopf der Spargelpflanzen sollte etwa 18 bis 22 cm unter der Bodenoberfläche liegen.
- Wurzelstöcke sollten mit 10 cm feinkrümeligem Boden abgedeckt sein.
- Vor Herbizidmaßnahmen auf gut abgesetzten Boden achten.
- Ca. 7 Tage nach Pflanzung, vor Sichtbarwerden des Austriebs, können bei entsprechenden Boden- und Witterungsverhältnissen die Herbizidmaßnahmen durchgeführt werden.

* auf leichten Standorten und vor stärkeren Niederschlägen niedrigere Aufwandmenge favorisieren

Herbizidempfehlungen in Spargel

Ertragsanlagen – nach der Stechperiode

Beim Einsatz von Bodenherbiziden ist eine ausreichende Bodenfeuchte für gute und sichere Wirkungen erforderlich!!!

AFU, WH, Einj. Rispe, W.-Gänsefuß,
Hirtentäschel, Kamille, Klette, Knöterich-A.,
Nachtschatten, Stiefmütterchen, Taubnessel,
Vogelmiere

**Artist 2,0*-2,5 kg/ha + Centium 36 CS 0,2 l/ha +
Herbosol 0,4 l/ha**

Einj. Rispe, Ehrenpreis, W.-Gänsefuß,
Kamille, Nachtschatten, Stiefmütterchen,
Taubnessel, Vogelmiere


**Sencor Liquid 0,3l/ha + Stomp Aqua 3,0 l/ha +
Centium 36 CS 0,2 l/ha + Herbosol 0,4 l/ha**

Einj. Rispe, Ehrenpreis, Hirtentäschel, W.-
Gänsefuß, Kamille, Klette, Knöterich-Arten,
Stiefmütterchen, Taubnessel, Vogelmiere

**Sencor Liquid 0,5 l/ha + Centium 36 CS 0,2 l/ha +
Herbosol 0,4 l/ha**

Einj. Rispe, Ehrenpreis, Kamille, Nachtschatten,
Stiefmütterchen, Taubnessel, Vogelmiere


**Stomp Aqua 3,0*-3,5 l/ha + Spectrum 1,0*-1,4 l/ha
+ Centium 36 CS 0,2 l/ha + Herbosol 0,4 l/ha**



Stechende



vor Austrieb




beginnender Aufwuchs

* auf leichten Standorten und vor stärkeren Niederschlägen niedrigere Aufwandmenge favorisieren

Herbizidempfehlungen in Spargel

Ertragsanlagen

Unterblattspritzung:



© BBCH-Stadien BASF SE

Gänsedistel, Hirtentäschel,
Kamille, **Klettenlabkraut**,
Knöterich, W.-Gänsefuß,
Nachtschatten, **Taubnessel**

- + **Unterstützung** auf Kamille und Nachtschatten
- + **Einj. Rispe**, Hirtentäschel, Kamille, Vogelmiere
- + Windenknöterich, **Vogelmiere**

Acker-Kratzdistel,
Gänsedistel, Kamille

Ackerfuchsschwanz,
Windhalm, Einj. Rispe

Ackerfuchsschwanz,
Windhalm

- + **Quecke** (Niederhaltung zur besseren Kulturführung)

Unkräuter

Lentagran WP 1,5 kg/ha + **Buctril** 0,5-0,75 l/ha

oder

Vorox F 0,3 kg/ha + **Buctril** 0,5-0,75 l/ha

Spectrum** 1,0*-1,4 l/ha

oder

Sencor Liquid 0,35*- 0,5 l/ha

oder

Centium 36 CS 0,15 - 0,25 l/ha

Lontrel 720 SG 167 g/ha (mit Abschirmung/Unterblatt)

Ungräser inkl. Einjähriger Rispe

Select 240 EC 0,75 l/ha + **Radiamix** 1 l/ha

Ungräser ohne Einjährige Rispe

Fusilade Max 1,0 l/ha

Fusilade Max 2,0 l/ha

* auf leichten Standorten und vor stärkeren Niederschlägen niedrigere Aufwandmenge favorisieren ** sinnvoll in Kombination mit 0,4 l/ha Herbosol