

Bestandteile

Ölrettich (Doublemax)

Rauhafer (Pratex)



Vorteile und Leistungen

- ✓ effektive biologische Nematodenbekämpfung in Kartoffelfruchtfolgen durch multiresistenten Ölrettich und Rauhafer
- ✓ je länger die Vegetationszeit, desto höher der Bekämpfungserfolg
- ✓ Verminderung der virusbedingten Eisenfleckigkeit

Durch die Kombination der Rauhafersorte Pratex und der multiresistenten Ölrettichsorte Doublemax ermöglicht der Anbau von topsoil solapro EU biologische Nematodenbekämpfung auf höchstem Niveau. Neben einer aktiven Reduzierung der wandernden Wurzelneematoden (*Pratylenchus penetrans*) durch den Rauhafer, führt der Anbau der Ölrettichsorte Doublemax zu einer geringeren Vermehrung der Wurzelgallenneematoden (*Meloidogyne chitwoodi*). Darüber hinaus bewirkt ein neutrales Verhalten gegenüber den Kartoffel- (*Globodera* ssp) und *Trichodorus*-Nematoden eine natürliche Abnahme der Schädlinge, wodurch die Übertragung des Tabak-Rattle-Virus und damit die virusbedingte Eisenfleckigkeit im Kartoffelanbau reduziert wird. Der zügige Aufbau ober- und unterirdischer Biomasse verhindert das Auflaufen von Unkräutern und Ungräsern, lockert den Boden und fördert die Humusbildung.

Anbauempfehlung

Aussaattermin	bis spätestens 25.08.
Saatstärke	50 bis 55 kg/ha
Aussaattechnik	Drillsaat, Grubbersaat mit Pneumatikstreuer
Fruchtfolge	Kartoffeln, Getreide, Gemüse, Zuckerrüben, Mais